

Behandlungsstandard „Indikation zur stationären Aufnahme“

Checkliste

Erstauftreten von Typ 1 Diabetes (mit /ohne Ketoazidose)

Schwere Insulinresistenz

schwere Hypoglykämie (Fremdhilfe war notwendig)

rezidivierende Hypoglykämien

(Verdacht auf) **Hypoglykämie-Wahrnehmungsstörung**

Verdacht auf **Dawn-Syndrom**

unerklärliche und / oder starke Blutzuckerschwankungen von > 100 mg/dl (5,5 mmol/l) pro Tag

entgleister Diabetes unklaren Typs mit **Symptomen wie Exikose** o.ä.

diabetologische Komplikationen, die durch diabetologische Schwerpunktpraxis mit Einbeziehung von Fachspezialisten (z.B. Kardiologe, Nephrologe, Psychotherapeut u.ä.) nicht beherrschbar sind

Therapieziele sind in **diabetologischer Mit-/Behandlung nicht erreicht** worden

präkonzeptionelle Diabeteseinstellung verlangt

Einstellung einer **diabetischen Schwangeren**
Neueinstellung auf eine **Insulinpumpe**

Korrektureinstellung bei **Insulinpumpenbehandlung**

Diabetisches Fußsyndrom (Wagner/Armstrong A2-5, B2-5, C1-5 und D1-5, Verdacht auf Charcot-Fuß)

Patient ist **nicht ambulant an einen Diabetologen anbindbar**, z.B. Immobilität, ständig wechselnder Arbeitsort

Patient ist hochgradig **sehbehindert/blind/gehörlos/mit eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten**

Patient spricht **nicht ausreichend deutsch/ ist Analphabet**

Patient benötigt stationäre **psychologische Mitbehandlung** z.B. wegen Depression/Copingstörung/Motivation-/Akzeptanzproblem/Verdacht auf Essstörung

Patient ist Kind/Jugendlicher **ohne erreichbare ambulante pädiatrisch-diabetologische Behandlungsmöglichkeit**

ein ambulanter **Diabetologe ist nicht erreichbar** (in 50km/60Min nicht erreichbar)

beim ambulanten **Diabetologen keinen Termin innerhalb 4 Wochen erhalten**

die **Einweisung** erfolgt durch einen **Diabetologen**

Darüber hinaus sollte erfasst werden:

Teilnahme am DMP Diabetes mellitus Typ 1 / Typ 2 ?

In ambulanter Mitbehandlung beim Diabetologen? (Name des Diabetologen erfassen!)